

XXI Jornada Científica Profesoral y de Profesionales de la Salud. VI Convención de Salud



RESUMEN DE CONFERENCIA

**Caracterización de algunos factores de riesgo del intento suicida en adolescentes. La Palma, 2022**

**Characterization of some risk factors for suicide attempts in adolescents. La Palma, 2022**

Anaisa Crespo Morales<sup>1</sup> , Reina Rosa Marín Hernández<sup>1</sup>, Roberkis Rodríguez Avila<sup>1</sup>, Carlos Rafael Rojas Toledo<sup>1</sup>, Erlis Peñalver Martínez<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universidad de Ciencias Médicas. Policlínico Cmunitario Pedro Borrás Astorga, La Palma. Pinar del Río, Cuba.

**Citar como:** Crespo Morales A, Marín Hernández RR, Rodríguez Avila R, Dr. Rojas Toledo CR, Peñalver Martínez E, Caracterización de algunos factores de riesgo del intento suicida en adolescentes. La Palma, 2022. Salud, Ciencia y Tecnología - Serie de Conferencias 2022; 1(3):229. Disponible en: <https://doi.org/10.56294/sctconf2022229>

Recibido: 03-10-2022

Revisado: 17-10-2022

Aceptado: 27-10-2022

Publicado:

**RESUMEN**

**Introducción:** los intentos suicidas se han incrementado considerablemente en los adolescentes y jóvenes en las últimas décadas, según lo reflejan estudios en diversos países.

**Objetivo:** caracterizar los factores de riesgo que estuvieron presentes en los adolescentes que realizaron intento suicida, en el período comprendido de enero de 2020 a noviembre de 2022, perteneciente al Policlínico Pedro Borrás Astorga municipio La Palma.

**Métodos:** se realizó un estudio descriptivo, transversal en adolescentes con intento suicida, pertenecientes al Policlínico Pedro Borrás La Palma, en el período comprendido de enero de 2020 a noviembre de 2022. Para la obtención de los datos se realizó una visita a los departamentos de Higiene y Epidemiología y Estadística de dicho policlínico, además, se visitaron los consultorios médicos de familia a que pertenecen estos adolescentes y se revisaron historias de salud individual y familiar de los mismos, previo consentimiento informado.

**Resultados:** se encontró un predominio del sexo femenino, y del grupo de edad de 15 a 19 años. El mayor número de estos adolescentes estudian y tienen un nivel de escolaridad preuniversitario, con un predominio de pertenencia a familias disfuncionales. Los principales factores de riesgo encontrados fueron la ruptura de relaciones amorosas, conflictos familiares y los antecedentes familiares hereditarios, siendo la ingestión de psicofármacos el método más frecuente empleado.

**Conclusiones:** la caracterización de algunos de los factores de riesgo presentes en los adolescentes con intento suicida estudiados resulta de vital significación para poder intervenir en la reducción del riesgo suicida y evitar así que el hecho se consuma.

**Palabras clave:** Factores de Riesgo; Intento Suicida; Salud Mental.

**ABSTRACT**

**Introduction:** suicide attempts have increased considerably in adolescents and young people in recent

decades, as reflected by studies in various countries.

**Objective:** to characterize the risk factors that were present in adolescents who made a suicide attempt, in the period from January 2020 to November 2022, belonging to the Pedro Borrás Astorga Polyclinic in the municipality of La Palma.

**Methods:** a descriptive, cross-sectional study was carried out in adolescents who attempted suicide, belonging to the Pedro Borrás La Palma Polyclinic, in the period from January 2020 to November 2022.in order to obtain the data, a visit was made to the Hygiene and Epidemiology and Statistics departments of said polyclinic, in addition, the family medical offices to which these adolescents belong were visited and their individual and family health histories were reviewed, with prior informed consent.

**Results:** a predominance of the female sex was found, and the age group was 15 to 19 years. Most of these adolescents are studying and have a pre-university level of schooling, with a predominance of belonging to dysfunctional families. The main risk factors found were the breakup of love relationships, family conflicts and hereditary family antecedents, with the ingestion of psychotropic drugs being the most frequent method used.

**Conclusions:** the characterization of some of the risk factors present in the adolescents with suicide attempts studied is of vital importance in order to be able to intervene in the reduction of suicidal risk and thus prevent the suicide attempt from being consummated.

**Keywords:** Risk Factors; Suicide Attempt; Mental Health.